

*Beispiel Abstract „Forschung“ (Präsentation von Studienergebnissen)*

**Titel:**

Kann das Risiko erneuter Gewalterlebnisse durch die Behandlung einer PTSD reduziert werden? Ergebnisse einer randomisierten kontrollierten Studie

**Hintergrund:** Frauen, die eine PTSD nach interpersoneller Gewalt entwickeln, weisen ein erhöhtes Risiko für eine erneute Viktimisierung auf. Diese Studie untersucht, ob die Behandlung von PTSD bei weiblichen Opfern interpersoneller Gewalt das Risiko zukünftig interpersonelle Gewalt zu erleben, verringern kann.

**Methode:** In einer randomisiert-kontrollierten Studie wurden Frauen, die interpersonelle Gewalt erlebt und eine PTSD (gemessen mit dem CAPS) entwickelt hatten, zufällig in eine Behandlungsgruppe (Kognitive Verhaltenstherapie; n=76) bzw. eine Wartelisten-Kontrollgruppe (n=64) eingeteilt. Die Teilnehmerinnen wurden zu vier Messzeitpunkten untersucht: Prä, Post, 3 und 6 Monate Follow-Up.

**Ergebnisse:** Zum 6 Monate Follow-Up zeigten Frauen, die nach der Behandlung keine PTSD-Diagnose mehr aufwiesen, im Vergleich zu Frauen, die die PTSD-Diagnose beibehielten, eine 4-fach höhere Wahrscheinlichkeit erneut interpersonelle Gewalt zu erleben (95% CI: 1.3, 21.9;  $p < .01$ ). Dieser Befund bestand auch nach der Kontrolle von depressiven Symptomen und vorherigen Erlebnissen interpersoneller Gewalt.

**Schlussfolgerung:** Die Ergebnisse haben bedeutsame Implikationen für die Prävention interpersoneller Gewalt bei Frauen.